

# AUTOVACINA

VACINA AUTÓGENA

CBHPM 4.03.10.35-3

AMB 28.10.055-7

## Sinonímia:

"Vacina" de dessensibilização específica.

"Vacina" autógena. "Autovacina".

## Material Biológico:

Qualquer material contendo bactérias-alvo.

## Coleta:

Idêntica como para cultura do material em questão. Considerar a adequação de coletar o material em meio de transporte de Stuart ou outro mais apropriado.

## Armazenamento:

Temperatura ambiente.

## Exames Afins:

Cultura e antibiograma.

## Valor Normal:

|   |
|---|
| Útil quando o germe isolado não pertence à flora normal do local da coleta. |
|---|

|  |
|--|
| Em geral, não se recomenda a aplicação da "vacina" quando o germe isolado pertencer ao gênero Streptococcus. |
|--|

## Preparo do Paciente:

Normalmente para essa coleta o paciente não deve fazer higiene prévia da região afetada e não deve estar tomando antibióticos por ao menos 10 dias.

## Interferentes:

Anti-sépticos. Antibióticos. Quimioterápicos.

## Método:

Isolamento em cultura, padronização da concentração de microrganismos, pasteurização e controle de esterilidade.

VALIDADE: até 6 meses quando conservado em geladeira entre +2 e +8°C. Ao retirar uma dose do frasco, antes de injetar, deixá-la atingir a temperatura ambiente dentro da seringa, mantendo o frasco sempre na geladeira.

## Interpretação:

### TRATAMENTO DE DESSENSIBILIZAÇÃO ESPECÍFICA

Modo de usar:

Teste preliminar: aplicar uma dose de 0,1 ml por via intradérmica. Se após 24 horas a reação local apresentar um halo de até 30 mm de diâmetro, as aplicações podem continuar normalmente conforme descrito abaixo. Se o halo for maior que 30 mm, então o frasco deve retornar ao laboratório para ajuste da concentração (diluição).

Doses subsequentes: agitar o frasco antes do uso; aplicar as doses sempre por via subcutânea; a cada 4 a 7 dias (conforme determinado pelo médico assistente) aplicar doses crescentes de +0,1 ml até atingir 1,0 ml (adultos) ou 0,7 ml (crianças); atingida a dose máxima, continuar as aplicações com a mesma dose até atingir o número de aplicações prescritas pelo médico ou até acabar.

Obs.: quando o intervalo entre duas aplicações tiver ultrapassado 7 dias ou caso ocorra febre ou cefaleia, a próxima dose deverá ser igual à anterior, isto é, deverá ser reduzida em -0,1 ml.

**Sitiografia:**

E-mail do autor: [ciriades@yahoo.com](mailto:ciriades@yahoo.com)