

PROLACTINA SUPRIMIDA POR L-DOPA

SUPRESSÃO DE PROLACTINA POR L-DOPA

CBHPM 4.07.12.41-9

AMB 28.05.043-6

Sinonímia:

Teste de depressão da Prolactina por L-Dopa.

Material Biológico:

Soro. 7 amostras.

Coleta:

1,0 ml de soro para cada tempo da curva.

7 tubos identificados respectivamente com seu tempo.

Armazenamento:

Congelar a -20°C .

Não estocar em freezer tipo frost-free.

Exames Afins:

Prolactina.

Valor Normal:

Normal	Não apresenta depressão ou esta é insignificante após 2 horas
Hiperprolactinemia	basal alto e depressão de $\pm 50\%$ a partir de 2 horas
Adenoma	basal muito alto a depressão de $\pm 50\%$ a partir de 2 horas

Preparo do Paciente:


Jejum de 10 ou mais horas. Água *ad libitum*. Manter o paciente deitado, em venoclise, desde uns 30 min antes de iniciar o teste. Coletar a amostra basal. Administrar VO, 10 mg de L-Dopa/kg de peso do paciente sem ultrapassar a dose de 500 mg. Cronometrar. Coletar as demais amostras nos tempos 60, 120, 180, 240, 300 e 360 minutos

Método:

Fluorimetria.

Interpretação:

Teste útil para diagnóstico de hiperprolactinemia de qualquer etiologia. Não serve para diagnóstico diferencial.



Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com