

TAENIA SPP.

SOLITÁRIA

CBHPM 4.03.03.07-1

AMB 28.03.009-5

Sinonímia:

Taenia saginata. Taenia solium.
Solitária.

Fisiologia:

Taxonomia:

Taenia saginata (patogênico)

Sinônimo: solitária.

Filo Platyhelminthes, Classe Cestoidea, Subclasse Cestoda, Ordem Cyclophyllidea, Família Taeniidae, Gênero Taenia, Espécie saginata.

Taenia solium (patogênico)

Sinônimo: solitária, cisticercose.

Filo Platyhelminthes, Classe Cestoidea, Subclasse Cestoda, Ordem Cyclophyllidea, Família Taeniidae, Gênero Taenia, Espécie solium.

Material Biológico:

Proglote isolado ou fragmentos de Taenia.

Coleta:

Enviar o material coletado com ou sem uso de medicação. Informar, se possível, se o(s) proglote(s) tinha(m) movimento próprio ou não.

Armazenamento:

Armazenar em frasco com água ou soro fisiológico.

Exames Afins:

Parasitológico de fezes.

Valor Normal:

<u>Taenia saginata</u>	solitária originária da carne bovina (boi, vaca). Não causa cisticercose no homem.
<u>Taenia solium</u>	solitária originária da carne suína (porco). Pode causar cisticercose no homem.

Preparo do Paciente:

Não coletar em frasco com álcool ou formol.

Interferentes:

Acondicionamento inadequado.

Método:

Avaliação microscópica da espécie da Taenia.

Interpretação:

Sua identificação só pode ser feita através da visualização das diferenças morfológicas dos proglotes maduros, baseada no número de ramificações laterais no útero do proglote grávido.

Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com